



OPTIMIZAR SU PLANTACIÓN

✂ **Antes de realizar la plantación**, pensar en cuáles fueron los cultivos anteriores. Los biodesinfectantes (sorgos o tagetes) o la vegetación natural (mostazas o facelias) pueden ser interesantes sobre todo por la aportación de nitrógeno. Un precedente de cereales (trigo, centeno...) también puede ser beneficioso.

✂ **A partir de mayo**, tomar una muestra de tierra para hacer un análisis químico y físico.

✂ **Preparar la tierra** en verano.

✂ **Desherbar** la parcela a final de julio y descompactarla en agosto.



✂ **Esparcir estiércol** bien descompuesto para limitar la liberación de amoníaco y/o aportar elementos minerales ricos en fósforo/potasio/magnesio/cal (según pH) (en caso de que sea necesario realizar una corrección tras los resultados del análisis del suelo). Labrar justo después.

✂ **Realizar dos pasadas** cruzadas con la grada rotativa para que el suelo esté lo más fino posible.

✂ **En caso de ser colinas**, hacerlo poniendo, en épocas secas, lonas biodegradables, para que la plantación se haga en las mejores condiciones de sol.

✂ **Recubrimiento vegetal recomendado** en el espacio entre hileras, desde el mes de septiembre, con, por ejemplo, una mezcla de 80% de festuca rubra y 20% de Ray Grass.

✂ **Quitar la lona** para el sol cuando se reciban los árboles.

✂ **Preparar el sistema radicular** de los árboles y poner fundas anticonejos.

✂ **Garrapiñar** las raíces (opcional).

✂ **En casos de plantación tardía** y/o en condiciones secas y ventosas, hidratar obligatoriamente los árboles.

✂ **Plantar con máquina o con pala. NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE PALANCAS:** riesgo de alisado de las paredes del suelo. Evitar también el palo inyector.

✂ **Compactar la tierra a los pies de los árboles** para evitar la formación de bolsas de aire y aprovechar para homogeneizar la altura de los puntos de injerto en relación al suelo. Lo ideal es ajustar la altura del punto de injerto entre 10 y 15 cm del suelo.

✂ **Fijar obligatoriamente los árboles** en el momento de la plantación para evitar bolsas de aire en el suelo y/o rotura de anticipados.

✂ **Regar** justo después de la plantación.

☞ **Realizar un primer estercolamiento** de mantenimiento, justo antes del brote. El fósforo favorecerá el desarrollo radicular de los árboles.

☞ **Importante:** no hacer competencia a los árboles con la presencia (débil o intensa) de adventicios durante el primer año.

☞ **En suelo muy ligero**, prever un segundo riego 15 días tras la plantación y si es necesario, volver a compactar la tierra alrededor de los árboles que parezcan estar mal anclados al suelo.

☞ **No detener el crecimiento vegetativo** de los árboles durante toda la temporada: el primer año sin frutos, buen seguimiento sanitario de la plantación, regar de forma razonable, estercolar...

A saber : cuanto más esté enterrado en el suelo el punto de injerto, más fuertes serán las reacciones vegetativas. Cuanto más alto esté el punto de injerto, menos se desarrollará el vegetal.

